

# Annones

*Annona spp*

LES ANNONES,  
un marché de niche



## En résumé

Les annones, pomme cannelle, corossol ou cœur de bœuf, restent un marché de niche qui gagnerait à être connu.

POUR TOUS LES GOÛTS

Il existe de nombreuses espèces, dont :

- le cherimoya (*Annona cherimola*),
- l'atemoya (croisement d'une pomme cannelle et d'un cherimoya, avec plusieurs variétés comme la Pink's Mammoth, l'African Pride),
- le cœur de bœuf (*Annona reticulata*),
- le corossol (*Annona muricata*),
- la pomme cannelle verte et mauve (*Annona squamosa*).

9 000 M<sup>3</sup> D'EAU POUR  
20 TONNES DE ANNONES  
PAR HECTARE

Les annones sont modérément résistantes à la sécheresse et nécessitent une irrigation régulière pour produire correctement. Il faut compter 90 mm par mois pour un hectare de verger à forte densité (400 plants), soit près de 9 000 m<sup>3</sup> d'eau à l'année par hectare. Les annones sont des fruits fragiles qui doivent être récoltés avant pleine maturité pour permettre leur transport. Les rendements fluctuent selon les espèces et les conditions d'exploitation, en moyenne 20 tonnes par hectare.

UNE RÉCOLTE AU BOUT  
DE 4 ANS

Les annones présentent trois stades : la phase végétative (plus ou moins longue selon les espèces, elle correspond à la croissance de la plante avant ses premières fleurs, puis à la production de branches et rameaux après chaque fructification), la floraison (elle débute trois à quatre années après la mise en terre et le cycle est variable selon les espèces). Certaines variétés présentent des difficultés de pollinisation impactant le rendement, la fructification (les annones sont productives, avec des fruits de tailles variables allant de 200 grammes à 1 kilogramme).

