

Avocat

Persea americana

LES AVOCATS,
une filière qui résiste
encore à l'importation



En résumé

Avec seulement 70 tonnes d'avocats vendues au marché de gros depuis deux ans, la filière avocat gagnerait à être redynamisée. Pour cela, les variétés précoces et tardives existent, permettant d'étaler la production afin que les consommateurs puissent trouver des avocats sur les étals entre février et novembre, alors qu'ils n'en trouvent qu'entre les mois d'avril et juin. Pour autant, les importations représentent 30 tonnes par an depuis ces deux dernières années.

POUR TOUS LES GOÛTS

Les variétés sont classées en fonction de leur origine géographique :

- mexicaines (rustiques, adaptées à des températures et une hygrométrie basses),
- guatémaltèques (variétés médianes, produisant des fruits moyens à petits noyaux),
- antillaises (dont les fruits sont les plus gros et les noyaux sont libres, très sensibles au froid et à l'aridité).

9 000 m³ D'EAU CONSOMMÉS POUR 15 TONNES D'AVOCATS PAR HECTARE

L'avocatier a besoin de 9 000 à 12 000 m³ d'eau à l'hectare annuellement, répartis convenablement en fonction du cycle de la plante. En moyenne, la production d'avocats peut atteindre 15 tonnes par hectare de rendement. Un verger d'avocatier est productif durant plusieurs décennies, c'est en fonction de son état de sénescence et de son niveau de production que l'on évalue la nécessité de son renouvellement.

UNE RÉCOLTE AU BOUT DE 5 ANS

Pour les arbres greffés, les premières récoltes peuvent avoir lieu entre la troisième et la cinquième année après plantation. Le cycle de l'avocatier se découpe en trois phases : la phase végétative (où la plante croît), la phase de floraison (où les arbres produisent des fleurs, il est conseillé de planter deux variétés d'avocateurs complémentaires, car leurs fleurs alternent la fonctionnalité de leurs organes et cela peut optimiser la fructification), et la phase de fructification (les différentes variétés produisent de façon décalée de février [Pernod] jusqu'en octobre [Gwen], la fructification a lieu en septembre pour les variétés de saison).

