

CLEMENTINE

Citrus Clementina Hort. ex Tan

Variété SRA 63

Autre nom : Algerian.

Selon Trabut (1902, 1926), cette variété très cultivée en Afrique du Nord proviendrait de l'hybridation accidentelle d'un plant de mandarinier commun réalisée par le père Clément Rodier dans le jardin de l'orphelinat des Pères du Saint Esprit, à Misserghin, village près d'Oran en Algérie. Le pollen proviendrait d'une variété décorative de *C. aurantium* appelée Granito. Plus récemment, Chapot (1963) supposait une origine chinoise du fait de sa ressemblance avec la mandarine Canton. Le Maroc, la Tunisie et l'Espagne sont les principaux producteurs méditerranéens de clémentine. La clémentine est le parent femelle de nombreux hybrides (Tangelos).



DATE DE FLORAISON	septembre	FORME DU FRUIT	aplatie
DATE DE MATURETE	avril		
EPOQUE DE PRODUCTION	précoces	ADHERENCE DE L'ECORCE	faible
ECART FLORAISON / MATURETE	7 mois	EPAISSEUR DE L'ECORCE	3 mm
POIDS DU FRUIT	138 g	NOMBRE DE GRAINES	36
RENDEMENT ARBRES DE 6 ANS	115 kg	TENEUR EN JUS	40 %
DIAMETRE POLAIRE	58 mm	SUCRES SOLUBLES (en degré Brix)	7.8 °
DIAMETRE EQUATORIAL	70 mm	ACIDITE TOTALE (g acide citrique)	1.01 g