

## DANCY

*Citrus Tangerina* Hort. ex Tan

Variété SRA 114

Autres noms : Dancy Tangerine, Obeni-Mikan.

Tanaka (1954) a suggéré une origine indienne pour cette mandarine qui aurait été très tôt introduite dans le sud de la Chine. Le premier pied de Dancy a été planté dans le verger de G.L. Dancy à Orange Mills, en Floride, en 1867. Il provenait d'un arbre (mandarinier Moragne) qui avait été introduit de Tanger (Maroc) et planté à Palatka par le major Atway, qui vendit ensuite son verger à N.H. Moragne en 1843.



DATE DE FLORAISON	septembre	FORME DU FRUIT	aplatie
DATE DE MATURETE	mai		
EPOQUE DE PRODUCTION	fin de saison	ADHERENCE DE L'ECORCE	faible
ECART FLORAISON / MATURETE	8 mois	EPAISSEUR DE L'ECORCE	2 mm
POIDS DU FRUIT	137 g	NOMBRE DE GRAINES	14
RENDEMENT ARBRES DE 6 ANS	73 kg	TENEUR EN JUS	40 %
DIAMETRE POLAIRE	56 mm	SUCRES SOLUBLES (en degré Brix)	8 °
DIAMETRE EQUATORIAL	68 mm	ACIDITE TOTALE (g acide citrique)	0.97 g