

## COMMUNE

*Citrus deliciosa* Ten.

Variété SRA 118

Autres noms : Mediterranean, Willow leaf, Avana, Baladi, Setubal.

D'après Chapot (1962), cette mandarine serait apparue en Italie dans les années 1810-1820. Elle est aussi présente en Egypte et à Malte à partir de 1830 et en Algérie depuis 1850. Elle a été donnée aux Etats Unis par le consul italien de la Nouvelle-Orléans vers 1840. Peu de temps après, elle a été diffusée en Floride et en Californie. Son origine est inconnue, mais il semblerait que ce soit un semis d'une mandarine originaire de Chine



DATE DE FLORAISON	octobre	FORME DU FRUIT	aplatie
DATE DE MATURITE	mars		
EPOQUE DE PRODUCTION	précoce	ADHERENCE DE L'ECORCE	faible
ECART FLORAISON / MATURITE	5 mois	EPAISSEUR DE L'ECORCE	2 mm
POIDS DU FRUIT	142 g	NOMBRE DE GRAINES	13
RENDEMENT ARBRES DE 6 ANS	99 kg	TENEUR EN JUS	44 %
DIAMETRE POLAIRE	50 mm	SUCRES SOLUBLES (en degré Brix)	8.7 °
DIAMETRE EQUATORIAL	69 mm	ACIDITE TOTALE (g acide citrique)	1.14 g