

**WASHINGTON***Citrus oblonga* Hort. ex Y.Tan.

Variété SRA 141

Autres noms : Bahia, Riverside, Baia, Baiana.

L'origine de la variété n'est pas bien connue, mais d'après Popenoe (1917), il s'agirait de la mutation d'une variété Selecta trouvée près de Bahia, au Brésil et multipliée entre 1810 et 1820. La variété a ensuite été introduite en Australie en 1824, en Floride en 1835, puis en Californie en 1870. Les arbres fournis à L.C. Tibbets de Riverside ont été à la source de l'appellation Washington à la suite de leurs introductions de **Washington D.C.**.



DATE DE FLORAISON	septembre	FORME DU FRUIT	ronde
DATE DE MATURITE	mars		
EPOQUE DE PRODUCTION	précoce	ADHERENCE DE L'ECORCE	moyenne
ECART FLORAISON / MATURITE	6 mois	EPAISSEUR DE L'ECORCE	3 mm
POIDS DU FRUIT	347 g	NOMBRE DE GRAINES	0
RENDEMENT ARBRES DE 6 ANS	96 kg	TENEUR EN JUS	47 %
DIAMETRE POLAIRE	102 mm	SUCRES SOLUBLES (en degré Brix)	8 °
DIAMETRE EQUATORIAL	94 mm	ACIDITE TOTALE (g acide citrique)	0.96 g